



Vejledning i håndopmadning med Psittacus-produkter.

Psittacine Crop Milk - Step 1.

Crop Milk bruges i ungerens første levetid fra klækning til de er 5-7 dage gamle afhængig af arten.

Crop Milk er et højt koncentreret foder til de første leve dage. Vi anbefaler 7-8 fordringer pr. døgn de første dage. Crop Milk røres op i ca. 38 – 40 grader varmt vand. Start med 25% Crop Milk og 75% varmt vand - langsomt øges mængden af Crop Milk, så det efterhånden bliver en tynd grød hen over de 5 – 7 dag - lidt ligesom yoghurt.

Indhold : 44% protein 40% fedt.

Neonatal Hand-Feeding - Step 2.

Neonatal Hand-Feeding bruges fra ungerne er 5-7 dage gamle og til der begynder at komme fjerstappe (ca. 3 uger gamle). Anbefalet antal fordringer i døgnet er ca. 6 gange, og 7-10 ml. pr 100 gram fugl ad gangen. Krogen skal være tømt mindst 1 gang i døgnet (det klares typisk om natten, hvor der indkøres færre gange fodring efterhånden). I takt med at fodermængden øges, kan man langsomt nedsætte antallet af gange, der fodres – fortrinsvis om natten – f.eks. fodres sidste gang om aftenen ca. kl. 23.00 – og næste gang ca. kl. 06.00 om morgenen.

Blandes med 38-40 grader varmt vand i konsistens som en tynd grød - lidt ligesom yoghurt.

Indhold : 24 % protein 20% fedt.

High Energy – til Gråpapegøjer, Ara og afrikanske papegøjer m.v.

High Energy plus – til de store Ara

High Protein – til Amazoner, Pionus, Ædelparakitter, Caique m.v.

Mini – til undulater, Nymfeparakitter, Dværpapegøjer, Græsparakitter, Rosa Kakadue m.v.

Cackatoo Special – til alle Kakaduer

Eclectus Special – til Ædelpapegøjer

Lory Special – til alle Lorier

Step 3.

Dette foder anvendes fra ca. 3 ugers alderen, hvor ungerne har fået fjerstappe og til ungerne er færdigudviklet. I den sidste del af perioden begynder man langsomt at give småtskåret frugt og



grønt for at lette overgangen til pellets – i første omgang gives de mindre Omega pellets – og efterfølgende den Psittacus pellet, som fremover skal være deres hovedfoder.

Dagligt forbrug af pellet til den voksne fugl er ca. 10-12% af deres kropsvægt. Den optimale fodring er 70 % pellet og 30 % frugt og grønt – men det afhænger selvfølgelig af arten.

Yderligere oplysninger om protein og fedtindhold samt vitaminer og mineraler kan findes i brochuren under punktet Nutritional Analysis side 46 – 49.

PsittaNuts ønsker dig held og lykke med håndopmadningen.

